



Heidbergweg 22-24
45257 Essen

Fon 0201 455-0
Fax 0201 455-2953

St. Josef-Krankenhaus
Kupferdreh



www.kkrh.de
info@kkrh.de



Dr. Jürgen Friedrich
Chefarzt
Facharzt für Allgemein- und
Viszeralchirurgie/Proktologie/
Spezielle Viszeralchirurgie

j.friedrich@kkrh.de



Roland Gwosdz
Oberarzt
Facharzt für Allgemein-
und Viszeralchirurgie/
Spezielle Viszeralchirurgie

r.gwosdz@kkrh.de



Carsten Hebler
Oberarzt
Facharzt für Chirurgie
und Viszeralchirurgie

c.hessler@kkrh.de



Giulia Kemper
Oberärztin
Fachärztin für Allgemein-
chirurgie und Unfallchirurgie

g.kemper@kkrh.de

■ Sprechstunden

Dr. Jürgen Friedrich
Mo., Di. und Do., 15-16 Uhr | EG, Raum 0.46
Proktologische Sprechstunde
Do. ab 14.15 Uhr | Endoskopie, 2. Etage

Roland Gwosdz
Mi., 15-16 Uhr | EG, Ambulanz
Proktologische Sprechstunde
Di. ab 14.15 Uhr | Endoskopie, 2. Etage

Carsten Hebler
Do., 15-16 Uhr | EG, Ambulanz

Giulia Kemper
Mo., 15-16.20 Uhr | EG, Ambulanz

■ Anmeldung im Sekretariat


- Mo., 8-17 Uhr
- Di. und Do., 8-18 Uhr
- Mi. und Fr., 8-13 Uhr

Dagmar Förster | d.foerster@kkrh.de
Julia Gerzen | j.gerzen@kkrh.de

EG, Raum 0.46

Fon 0201 455-1301
Fax 0201 455-2955

■ Anfahrt



01.2017

■ Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Buslinie 180 ab Bahnhof Kupferdreh,
Haltestelle ‚Kupferdreh Krankenhaus‘.

■ Mit dem Auto

A 44 Ausfahrt ‚Überruhr‘ oder ‚Kupferdreh‘ nehmen,
das St. Josef-Krankenhaus ist ausgeschildert.
Parkhaus im Heidbergweg.



Chirurgie mit Bauchgefühl

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie/Proktologie

Liebe Patientin,
lieber Patient.

Behandlungsspektrum

Besondere Schwerpunkte



In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie behandeln wir in enger Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen unserer Einrichtung, Hausärzten und Internisten alle Erkrankungen der Verdauungsorgane, einschließlich des Enddarms (Proktologie), der Bauchwand und der Schilddrüse. Bei der Therapie von Krebserkrankungen treffen sich die Experten aller Fachrichtungen zu regelmäßig stattfindenden Tumorkonferenzen.

■ Schonende Operationen

In vielen Fällen können wir schonend mit dem Endoskop oder Laparoskop operieren, etwa bei der Entfernung der Gallenblase. Bei Darmoperationen sind viele Patienten dank der sogenannten Fast-Track-Chirurgie schnell wieder auf den Beinen. Durch die kleineren Wunden der minimal-invasiver Operationstechniken und durch schonende Narkoseverfahren bleibt den Patienten langes Nüchternsein vor und nach dem Eingriff erspart.

Minimal-invasive Operationen

Gut- und bösartige Erkrankungen an Magen, Gallenblase, Gallensteine, Dünn- und Dickdarm, Blinddarm

Tumorchirurgie

Dickdarm-, Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs

Operationen bei entzündlichen Darmerkrankungen

Offene und minimal-invasive Verfahren bei Divertikulitis, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa u.a.

Versorgung von Bauchwandbrüchen

Offene und endoskopische Verfahren bei Leisten-, Nabel- und Narbenbrüchen

Schilddrüsenoperationen

Knotenbildung ohne und mit Überfunktion, Basedow-Erkrankung, Schilddrüsenkrebs

Proktologie

Hämorrhoiden, Fisteln, Fissuren und Abszesse, Entfernen von Dickdarmtumoren durch den After

■ Darmchirurgie und Proktologie

Innerhalb des Darmzentrums Ruhrhalbinsel erhalten die Patienten eine qualifizierte Versorgung bei Darmkrebs, die von der Diagnostik über die Operation bis hin zur Nachsorge alle Schritte beinhaltet.

Dank unserer Spezialisierung im Bereich Proktologie können wir Patienten mit Enddarmliden mit schonenden Operationsverfahren helfen.

■ Hernienchirurgie

Für die Versorgung von Leisten-, Narben-, Nabel- oder Zwerchfellbrüchen mit und ohne Einsatz von Netzimplantaten steht im Hernienzentrum am St. Josef-Krankenhaus Kupferdreh ein spezialisiertes Team bereit.

■ Schilddrüsenchirurgie

In Zusammenarbeit mit den zuweisenden Hausärzten, Nuklearmedizinern und Endokrinologen bieten wir das gesamte Spektrum der Schilddrüsenchirurgie an. Dazu zählt die Therapie aller krankhaften Vergrößerungen, Fehl-, Über- oder Unterfunktionen der Schilddrüse, z.B.:

- Strumen (Kröpfe)
- Gutartige Knoten
- Zysten
- Hyperthyreose
- Morbus Basedow
- Bösartige Veränderungen (papilläres, follikuläres, medulläres, anaplastisches Karzinom)
- Lymphknotenmetastasen von Schilddrüsenkarzinomen

Durch das sogenannte Neuromonitoring vor, während und am Ende der Operation wird der Stimmbandnerv, der nahe an der Schilddrüse verläuft, überwacht.

